

Le Bruant à gorge blanche

Par Donald McCutcheon

En se promenant en forêt entre les mois d'avril et d'octobre, un bruissement sur le sol peut attirer l'attention sur un petit oiseau brun. Il s'agit probablement du Bruant à gorge blanche qui, avec de vifs mouvements des deux pattes, retourne les débris à la recherche de graines ou d'insectes.



- Les rayures de la tête, la gorge blanche et la tache jaune entre l'œil et le bec sombre sont caractéristiques chez les adultes. Une différence notable s'observe chez ce bruant, il est polymorphe : les rayures de sa tête peuvent être soit blanches et noires, soit chamois et brunes. Chez l'adulte à rayures blanches, la calotte est noire, séparée par une étroite strie blanche, le jaune entre l'œil et le bec est vif et se prolonge par un large sourcil blanc. Chez l'adulte à rayures chamois, le plumage est plus terne : le sourcil, brun chamoisé clair, est jaune terne entre l'œil et le bec.
- Des études ont démontré qu'il existe des différences de comportement entre les deux formes. Les mâles à rayures blanches chantent davantage et sont plus agressifs à l'égard d'autres individus chanteurs que les mâles à rayures chamois. Seules les femelles à rayures blanches chantent à l'occasion. Parce que ces femelles chantent, les mâles à rayures blanches sont agressifs envers elles. Il en résulte que les oiseaux à rayures blanches et noires s'accouplent généralement avec des oiseaux à rayures chamois; les mâles à rayures chamois, moins agressifs, attirent plutôt les femelles à rayures blanches.

Le Bruant à gorge blanche fréquente principalement les abords des forêts mixtes ou « conifériennes » et niche dans les boisés semi-ouverts. Le nid est construit au sol ou tout près. Il est construit par la femelle qui pond de 4 à 6 œufs qu'elle incube pendant 11 à 14 jours. Les jeunes quittent le nid dès l'âge de 8 ou 9 jours et peuvent voler 2 ou 3 jours plus tard. Ils sont toutefois nourris par les deux parents jusqu'à l'âge de 3 ou 4 semaines. L'été, ce sont les insectes qui composent la plus grande partie de son régime alimentaire, mais en dehors de cette saison, il consomme tant de matières animales que végétales. Au mois d'octobre, il migre vers le sud des États-Unis et le nord du Mexique pour hiverner.

Sur ses aires de nidification, on repère facilement ce bruant à son chant, l'un des mieux connus des chants d'oiseaux. Son sifflement clair a été interprété comme « Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric ». À son retour au printemps, le Bruant à gorge blanche, une espèce abondante au Québec, rend la forêt plus vivante et émerveille le promeneur à la recherche de la vie qui l'habite.