

Le Pic mineur Par Gisane Routhier



Le Pic mineur est la plus petite et la plus commune des espèces de Pics de l'Est de l'Amérique du Nord. Même s'il fréquente les parcs urbains et les vergers, ce petit picidé préfère vivre là où poussent le peuplier, le bouleau et le frêne.

Lorsque vous l'observez, remarquer la large bande blanche qu'il porte au milieu du dos et qui s'étend jusqu'au croupion. La poitrine et les flancs sont blancs; la couronne est noire; les joues et le cou sont marqués de lignes noires et blanches. Le bec, plus court que le chevelu, est droit et possède une longue langue munie de poils qui permet d'aller chercher des insectes, des œufs d'insectes ou des larves dans les crevasses et les fentes. Même s'il lui arrive de manger de petits fruits, pour l'attirer à nos mangeoires pendant la saison froide, un mélange de beurre d'arachides et de saindoux fera son grand bonheur.

Le mâle et la femelle ont à peu près la même taille, mais le mâle a une petite tache écarlate à l'arrière de la couronne. Chez le chevelu cette petite tache est ordinairement coupée par une ligne noire. Autre détail important : il porte des stries noires sur les rectrices externes blanches (plumes des côtés extérieurs de la queue) ces dernières étant totalement blanches chez le chevelu.

Comme la plupart des pics, le Pic mineur est un grimpeur. Ses courtes pattes munies de quatre doigts, deux orientés vers l'avant et deux vers l'arrière, permettent à l'oiseau de s'agripper solidement. Pour grimper, il s'appuie sur les rectrices rigides et pointues de sa queue et garde le corps rivé au tronc ou à la branche, balançant la tête. L'oiseau peut grimper, redescendre en spirale et sauter prestement de côté à une vitesse incroyable.

C'est en tambourinant sur des branches sèches que le couple communique. C'est en février et mars que le mâle et la femelle choisissent le territoire de nidification et creusent, dans un arbre mort, un trou capable d'accueillir 4 ou 5 œufs blancs lesquels sont incubés pendant une douzaine de jours. Les oisillons restent au nid environ 21 jours. Aussitôt qu'ils en sortent, ils dépendent de leurs parents pendant encore 3 semaines. En automne, le Pic mineur devient indépendant et erre seul jusqu'au printemps suivant. Il peut vivre une dizaine d'années. Le Pic mineur, par sa lutte incessante aux ravageurs, mérite la protection de l'homme.

Le Pic mineur est l'emblème de notre club; le CORA. Il représente le travail du mineur forant l'amiante et se servant d'un pic comme outil de travail.